

Kelpak®

EXTRACTO DE ALGAS LÍQUIDO Para aplicación foliar y fertirrigación

CONTENIDO DECLARADO

Ácido algínico0,8% p/p

pH4,3

Conductividad 2,5dS/m

100% Jugo celular de *Ecklonia Maxima*

Contiene además polisacáridos, ácido algínico, manitol, micronutrientes y vitaminas. El producto está totalmente exento de metales pesados.

FORMA DE ACTUACIÓN

El contenido en sustancias naturales, promueve tanto el desarrollo radicular primario como secundario, favoreciendo el desarrollo del cultivo a través de la mejora nutricional.

En aplicaciones foliares, se estimula la elongación celular durante el desarrollo de los frutos, mejorando la producción final.

FINES PARA LOS QUE SE RECOMIENDA

Kelpak, está indicado para:

- Estimular los procesos fisiológicos de la planta.
- Favorecer el desarrollo radicular en las primeras fases del cultivo, bien en el trasplante de cultivos hortícolas y fresa, o bien en la brotación de especies leñosas, o tras una nueva plantación.
- Incrementar la acumulación de reservas en la planta. Mejorar la toma de nutrientes por parte del cultivo vía radicular.
- Potenciar el desarrollo de los frutos, para obtener cosechas con calibres superiores.

DOSIS Y APLICACION

Kelpak puede ser aplicado al suelo en el trasplante, mediante fertirrigación o en aplicación foliar.

- **Hortícolas:** En trasplante, inmersión en solución al 2,5%. Fertirrigación: 7 l/ha, concentrado. Foliar: 2 l/ha, 14 días después del trasplante y repetir a los 14 días.
- **Fresa:** En trasplante inmersión de raíces en solución 2,5%. Foliar: En fase productiva, 3 l/ha, cada 3 semanas.
- **Frutales y cítricos:** Foliar: 3-4 l/ha (3 aplicaciones), con una concentración mínima 1:300. Primera aplicación en frutales a 50% de floración. En cítricos, iniciar las aplicaciones en botón blanco.
- **Olivar:** Realizar 2 aplicaciones desde la floración coincidiendo con los tratamientos del Prays, sobre todo en 3ª generación. En olivar para aceite repetir en otoño. Foliar: 3 l/1000 l de agua, con un mínimo de 2 l/ha por tratamiento.
- **Uva de mesa:** Fertirrigación: 7 l/ha, en brotación. Foliar: 3 l/ha, a partir de bayas 4 mm. Concentración mínima 1:300.
- **Patata:** En siembra, a 1:300 sobre la semilla. Foliar: 4 l/ha, con suficiente área foliar. Repetir a 2 l/ha, 14 días después. No aplicar con tuberización.
- **Arroz:** Foliar: 2 l/ha en estado 2-4 hojas.



Es un concentrado natural de *Ecklonia maxima*, obtenido a través de un proceso exclusivo. La suma, de la *Ecklonia maxima* utilizada y este proceso industrial permite obtener un concentrado con una elevada relación de promotores naturales de desarrollo vegetal.

El proceso evita el uso de altas temperaturas y la adición de productos químicos, basándose en la aplicación de diferenciales de presión mecánicamente inducidos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE nº 834/2007 y 889/2008 y el Reglamento NOP. CAAE. INTERECO. Normas Fibl, Demeter y Naturland (Alemania).



Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (España)
Telf. +34 976 461 516
Fax +34 976 415 986
mail@daymsa.com
daymsa.com