

Sincronía y adelanto en la brotación

SYNCRON & NITROACTIVE

COMPOSICIÓN

Composición **SYNCRON**

Materia Orgánica Total80,0% p/p
Aminoácidos libres 2,0% p/p
Nitrógeno Total0,3% p/p
Nitrógeno Orgánico0,3% p/p

Composición **NITROACTIVE**

Nitrógeno total17,0% p/p (25,8% p/v)
Nitrógeno nítrico11,5% p/p (17,5% p/v)
Nitrógeno amoniacal...5,5% p/p (8,4% p/v)
Calcio (CaO).....12,3% p/p (18,7% p/v)

EFFECTOS Y BENEFICIOS

Contiene los siguientes aminoácidos libres: Asp, Glu, Ser, Gly, His, Arg, Thr, Ala, Pro, Tyr, Val, Met, Ile, Leu, Phe, Lys, Cys.

SYNCRON contiene sustancias naturales con acción bioestimulante de la brotación y que, junto con el aporte de **NITROACTIVE**, provocan un efecto sinérgico sobre la ruptura de la dormancia. La acción combinada de **SYNCRON** y **NITROACTIVE** estimula las yemas, sea cual sea su posición en la planta, y les aporta nutrientes fundamentales y compuestos inductores de actividad fitohormonal, para romper el reposo invernal y promover una brotación uniforme.

METODO DE APLICACIÓN

Es necesario agitar el producto antes de cada preparación de caldo. Para un correcto tratamiento, es necesario combinar la aplicación de **SYNCRON** junto con **NITROACTIVE**, debiéndose añadir éste al caldo en primer lugar, e incorporar posteriormente **SYNCRON**. Mantener agitación continua mientras se llena el tanque y durante la aplicación. Utilizar el volumen de caldo necesario para obtener un buen mojado de todas las yemas. Se debe aplicar con temperaturas ambiente entre 5°C y 20°C. No aplicar con condiciones de fuerte viento ni si se espera lluvia en las siguientes 24 horas. No aplicar con condiciones de fuerte viento ni si se espera lluvia en las siguientes 24 horas.

MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS

Para todos los cultivos donde se indica el tratamiento, cuatro-cinco semanas antes de la fecha prevista de brotación. En viña (uva de mesa y de vinificación), se toma como referencia de brotación el estado fenológico C y en cerezo y kiwi el estado fenológico B.

Cultivo	Concentración SYNCRON en caldo	Concentración NITROACTIVE en caldo	Volumen caldo (L/ha)
Uva de mesa	2%	15 – 20 %	400 - 700
Cerezo	1,5 - 2 %	15 – 20 %	500 – 700
Kiwi	2%	15 %	500 - 800

Sincronía y adelanto en la brotación

Efectos

- Aumenta el porcentaje de yemas brotadas
- Reduce la dominancia apical
- Uniformiza la fenología del árbol hasta cosecha
- Uniformiza la maduración

Beneficios

- Incrementa el valor de la cosecha
- Disminuye el coste de recolección
- Facilita la programación de los tratamientos fitosanitarios
- Es seguro para el operador y el medio ambiente
- No tiene efecto residual:
- no influye sobre la
- actividad fisiológica del próximo año

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE nº 834/2007 y 889/2008. SOHISCERT.



RD 506/2013
FERTILIZANTES
BUREAU VERITAS
Certification



Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (España)
Telf. +34 976 461 516
Fax +34 976 415 986
mail@daymsa.com
daymsa.com