



Naturfruit®

La calidad de la cosecha



Naturfruit®

La calidad de la cosecha

SCAN QR CODE



1150-POR/01

Camino de Enmedio, 120, 50013 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 516 · www.daymsa.com · mail@daymsa.com



O que é Naturfruit?

Naturfruit é uma formulação especial com uma alta concentração de potássio orgânico, que promove uma rápida assimilação e transporte deste elemento dentro da planta até aos frutos, maximizando a sua efetividade e gerando um aumento da produção. Desenvolvido para a prevenção e correção das carências de potássio e para favorecer a maturação dos frutos nas fases finais dos ciclos produtivos.

Os ácidos orgânicos de baixo peso molecular de Naturfruit participam diretamente em diversos processos fisiológicos da planta, tais como a respiração, fotossíntese e absorção de nutrientes, influenciando diretamente o rendimento e a qualidade das culturas. Os ácidos orgânicos contidos no Naturfruit incidem diretamente no metabolismo e na translocação de fotoassimilados para o fruto em estágios fenológicos críticos.

O Naturfruit melhora a cor e o calibre, quando aplicado no último terço do crescimento dos frutos, no momento de alta exigência de potássio. O facto de não ter Azoto **permite a utilização na última fase de crescimento celular e de maturação das frutas e legumes, sem afetar negativamente a pós-colheita.**

Qual a sua função? Por que escolher Naturfruit?

O produto possui alto teor de potássio, fundamental para a **formação de açúcares e óleos**, auxiliando na passagem das folhas para o fruto. Isso permitirá um **maior teor de matéria seca nos frutos, grãos, caules, folhas e tubérculos, resultando em um aumento significativo no peso e na produção.**

Os ácidos orgânicos contidos no Naturfruit **estimulam o metabolismo** e a translocação dos fotossintatos para a fruta em estágios fenológicos chave, **favorecendo um melhor sabor, cor e valor nutricional na cultura.**

Composição

Ácidos orgânicos	38,0% w/w (57,4% w/v)
Óxido de potássio solúvel em água (K ₂ O)	25,0 p/w (38,8% c/v)
pH	7,5

Produto isento de cloretos, nitratos, carbonatos e sulfatos.

Principais benefícios

- Apresenta um pH neutro.
- Grande compatibilidade com outros agroquímicos.
- Baixo risco de fitotoxicidade.
- **Fácil absorção e translocação.**
- Eficaz na **translocação e assimilação de nutrientes.**
- Evita um amadurecimento heterógeno e obtém um **melhor crescimento dos frutos.**
- Aumenta la calidad de la cosecha.
- Aumenta a resistência ao stress hídrico e á desidratação dos gomos, visto que mantém a taxa fotossintética.
- Potássio é indispensável para a formação de gorduras.

Doses e momento de aplicação

Cultura	Benefícios	Dose	Momento de aplicação
Pomóideas e prunóideas	Uniformidade da maturação. Aumento da Coloração. Maiores calibres.	300-500 cc/hL	Desde o início do crescimento da fruta até 10 dias antes da colheita
Nogueira e amêndoa	Uniformidade da maturação. Aumento da Coloração. Maiores calibres.	300-500 cc/hL	30 e 15 dias antes da colheita.
Citrinos	Uniformidade da maturação. Aumento da Coloração. Maiores calibres.	300-500 cc/hL	Juntamente com as aplicações para estímulo do crescimento do fruto, depois do vingamento, até 15 dias antes da colheita
Uvas de mesa e vinificação	Uniformidade da maturação. Maiores calibres.	300-500 cc/hL	Desde la formación de los ramilletes.
Horticultura frutífera (tomate, pimento...)	Uniformidade da maturação. Ganho de peso e tamanho dos frutos. Anticipa e uniformiza a maturação	300-500 cc/hL	No inverno, desde o início do desenvolvimento vegetativo, até 10 dias antes da colheita.
Morango, framboesa, Mirtilos	Uniformidade da maturação.	300-500 cc/hL	Desde o primeiro vingamento.
Melão	Uniformidade da maturação. Brix aumenta.	300-500 cc/hL	Desde do vingamento.
Olivial	Aumento do teor de gordura. Uniformiza e antecipa a maturação.	300-500 cc/hL	Juntamente com aplicações de aumento de calibre, após o vingamento, até 15 dias antes da colheita.
Tropicais (ananás, papaia, manga, etc.)	Uniformidade da maturação. Ganho de peso e grau brix.	300-500 cc/hL	Desde o início do crescimento da fruta até 10 dias antes da colheita
Trigo, soja, milho, arroz	Melhora o peso específico dos Grãos.	1-1.5 L/ha	Juntamente com a última aplicação de fungicida
Banana	Melhor desenvolvimento e qualidade do fruto. Maior calibre.	1-2 L/ha	Durante todo o ano.

